

বিশ্বিং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লাইভিলিহুডস ইন ভালনারেবল ল্যান্ডস্কেপস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
উপজেলা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ বুলেটিন (১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬)

আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন উপজেলা: ভোলাহাট

তারিখ: ১৯-০২-২০২৬

গত ৩ দিনের আবহাওয়ার পরিস্থিতি: ১৬.০২.২০২৬ থেকে ১৮.০২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত

জেলা: চাপাইনবাবগঞ্জ

বুলেটিন নম্বর: ১২৪

পূর্বাভাসের সময়কাল	১৬-০২-২০২৬	১৭-০২-২০২৬	১৮-০২-২০২৬
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০	০	০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৮	৩০	৩০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২	১১	১১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৭	৪৬	৪১
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৩	১৩	১৩
বাতাসের দিক	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৪ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস: ১৯.০২.২০২৬ থেকে ২২.০২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত

পূর্বাভাসের সময়কাল	১৯-০২-২০২৬	২০-০২-২০২৬	২১-০২-২০২৬	২২-০২-২০২৬
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০	০	০	০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০	৩২	৩৩	৩৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২	১২	১৪	১২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৭	৩৩	৩৮	৩৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১২	১২	২২	১৩
বাতাসের দিক	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম	উত্তর - পশ্চিম

Source: <https://usf.bmd.gov.bd/>

সময়কাল: ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ – ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

গম: পর্যায়: দানা গঠন

- আগামী চার দিনে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই এবং শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেজন্য নিয়মিত , মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকাকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকাকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্রোরপাইরিফস গুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

আম:

- আগামী চার দিনে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই এবং শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে।
- বর্তমানে আম গাছে মুকুল আসা শুরু হয়েছে। মুকুল বের হওয়ার কিছু ফুল ফোটার পূর্বে গাছে যখন মুকুল ৪-৬ ইঞ্চি হয়, তখন ০১ লিটার পানিতে ইমিডাক্লোপ্রিড গুপের কীটনাশক ০.৭৫ মিলি (তরল)/ ০.২ গ্রাম (দানাদার) এবং ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ০২ গ্রাম এই হারে মিশিয়ে সমস্ত গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন। এতে আমের হপার পোকা এবং এনথ্রাকনোজ রোগ দমন হবে।

সূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস রাজশাহী