


❖ লতা রোপনের পর বর্ষার পূর্বে (মার্চ-এপ্রিল মাসে ৭-১০ পরপর ২ বার) এবং বর্ষার পর (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ৭-১০ পরপর ২-৩ বার) ডিফেন্ডাইম জৈব বালাইনাশক (প্যাংকটের গায়ে নির্ধারিত নিয়ম মোতাবেক) এবং লাইকোম্যাক্স (সেয়েল রিচার্জ) জৈব বালাইনাশক ৪-৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পানের লতা, কান্ড এবং গোড়ার গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

❖ অথবা টেমুকোজল + ট্রাইফ্লুমিফ্রাইবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-লিটো ৭৫ ড্রিউ জি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ গ্রাম হারে অথবা মেটালেক্সিল + মেনাকোজের গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন - রিডোমিল গোল্ড) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গোড়াসহ সমস্ত গাছে লতা ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।



চিত্র ৪: সম্মানিত রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগমুক্ত পানের বরজ

### রোপের নাম : পানের ক্ষত বা পাতার দাগ (Anthracnose of Betel vine) রোগ।

রোগের কারণ : কোলেটোট্রিকাম পিপারিস (Colletotrichum pipers) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

### রোগের লক্ষণ

- ❖ প্রথমে পাতার ভিতরের দিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছোট ছোট ফোঁসের মত অসম দাগ পড়ে।
- ❖ দাগগুলো পরবর্তিতে হালকা বাদামী থেকে গাঢ় বাদামী হয় এবং চারিদিকে হলুদ বলয়ের সৃষ্টি হয়।
- ❖ দাগগুলো ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। অনেকগুলো দাগ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে বড় দাগ বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- ❖ পরে প্রতিটি দাগের মাঝখানে কালো ও চারিপাশে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- ❖ দাগগুলির মাঝখানটা শুকিয়ে যায় এবং সমগ্র পাতা নষ্ট হয়ে পড়ে।

### রোপের ব্যবস্থাপনা



- ❖ নতুন বরজ তৈরীর ক্ষেত্রে লতা লাগানোর কমপক্ষে ২১ দিন আগে হেক্টর প্রতি ৬০০ কেজি সরিষার/নিমের খৈল জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে ভালভাবে পচাতে হবে। অথবা লতা লাগানোর কমপক্ষে দিন আগে হেক্টর প্রতি ২.৫ টন ট্রাইকো-কস্পোস্ট জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ❖ সুস্থ সবল রোগমুক্ত পানের লতা রোপন করতে হবে।
- ❖ রোগ প্রতিরোধী জাত বারি পান-২ ও পারি পান-৩ চাষ করতে হবে।
- ❖ লতা রোপনের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেক্সিন + থিরাইম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন প্রোভেক্স ২০০ ড্রিউপি) দিয়ে লতা শোধন করে রোপন করতে হবে।
- ❖ পুরাতন বরজের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত গাছের লতা/পাতা বরজ থেকে তুলে পুড়ে ফেলতে হবে।
- ❖ পানের বরজ সব সময় আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❖ পান গাছসমূহের গোড়ায় মাটি দিয়ে একটু টুঁটু করে রাখতে হবে যেন বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে না থাকে।
- ❖ লতা রোপনের পর বর্ষার পূর্বে (মার্চ-এপ্রিল মাসে ৭-১০ পরপর ২ বার) এবং বর্ষার পর (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ৭-১০ পরপর ২-৩ বার) ডাইনামিক নামক জৈব বালাইনাশক ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পানের লতা, কান্ড এবং পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- ❖ অথবা প্রোপিকোজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন টিক্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানি ০.৫ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার পানের লতা ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে তবে ছত্রাকনাশক প্রয়োগের পর ৭ দিন পান সংগ্রহ করা যাবে না।



চিত্র ৪: সম্মানিত রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগমুক্ত পানের বরজ

### যোগাযোগের ঠিকানা



### মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

### উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

জুন, ২০২২

## পানের প্রধান প্রধান রোগবালাই ও তার দমন ব্যবস্থাপনা (Major disease of betel vine and their management)



### রচনা

ড. মোঃ ইকবাল ফারুক  
ড. এম. মনিরুল ইসলাম  
ড. মোঃ মুজিবুর রহমান  
ড. জাহান আল মাহমুদ  
ড. মোঃ শামীম আখতার  
ড. মোঃ মতিয়ার রহমান



উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ  
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১।