



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল



আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।  
www.dls.akhaura.brahmanbaria.gov.bd

হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর টিকাবীজের মূল্যতালিকা, প্রয়োগবিধি ও সংরক্ষণ

হাঁস-মুরগির টিকা

| টিকার নাম                        | ভায়াল প্রতি মূল্য     | টিকা প্রদান কাল  | প্রয়োগবিধি  | সংরক্ষণ        |
|----------------------------------|------------------------|--|--|----------------|
| বিসিআরডিভি (BCRDV)               | ২৫/=<br>(১০০ মাত্রা)   | ১ম ডোজ: ৫-৭ দিন;<br>২য় ডোজ: ১৮-২১ দিন                           | ৬ মিলি ডায়লুয়েন্টের সাথে গুলিয়ে<br>প্রতি চোখে ১ ফোঁটা   | ডিপ ফ্রিজ      |
| আরডিভি (RDV)                     | ২৫/=<br>(১০০ মাত্রা)   | ২ মাসের উপরে<br>(প্রতি ৬ মাস পর পর)                              | ১০০ মিলি ডায়লুয়েন্টের সাথে গুলিয়ে ১<br>মিলি রানের মাংশে | ডিপ ফ্রিজ      |
| গামবোরো (IBD)<br>ভ্যাকসিন        | ২৫০/=<br>(১০০০ মাত্রা) | ১ম ডোজ: ১০-২১ দিন;<br>২য় ডোজ: ১৭-২৮ দিন                         | ৫০ মিলি ডায়লুয়েন্টের সাথে গুলিয়ে<br>প্রতি চোখে ১ ফোঁটা  | ডিপ ফ্রিজ      |
| ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন              | ৫০/=<br>(১০০ মাত্রা)   | ৩ সপ্তাহের বেশী<br>(প্রতি ৬ মাস পর পর)                           | ১ মিলি চামড়ার নীচে  | নরমাল<br>ফ্রিজ |
| ফাউল পক্স (বসন্ত)<br>ভ্যাকসিন    | ৫০/=<br>(২০০ মাত্রা)   | ২১ দিনের বেশী যত<br>তাড়াতাড়ি সম্ভব                             | ৩ মিলি ডায়লুয়েন্টের সাথে গুলিয়ে<br>পাখার নীচে খুঁচিয়ে  | ডিপ ফ্রিজ      |
| পিজিয়ন পক্স ভ্যাকসিন            | ৪০/=<br>(১০০ মাত্রা)   | কবুতর: ৫-৭ দিন,<br>মুরগি: ২-৭ দিন                                | ৩ মিলি ডায়লুয়েন্টের সাথে গুলিয়ে<br>পাখার নীচে খুঁচিয়ে  | ডিপ ফ্রিজ      |
| ডাক প্লেগ ভ্যাকসিন               | ৫০/=<br>(১০০ মাত্রা)   | ১ম ডোজ: ১০ সপ্তাহ;<br>২য় ডোজ: ১৩ সপ্তাহ                         | ১০০ মিলি ডায়লুয়েন্টের সাথে গুলিয়ে ১<br>মিলি বুকের মাংশে | ডিপ ফ্রিজ      |
| সালমোনেলা (টাইফয়েড)<br>ভ্যাকসিন | ১২০/=<br>(১০০ মাত্রা)  | ১ম ডোজ: ৬-৮ সপ্তাহ;<br>২য় ডোজ: ১২ সপ্তাহ,<br>৩য় ডোজ: ৩৬ সপ্তাহ | ০.৫ মিলি ঘাড়ের চামড়ার নীচে<br>প্রতিবার                   | নরমাল<br>ফ্রিজ |

গবাদিপশুর টিকা

| টিকার নাম                                | ভায়াল প্রতি মূল্য   | টিকা প্রদান কাল | প্রয়োগবিধি   | সংরক্ষণ        |
|--|----------------------|-----------------|---|----------------|
| তড়কা ভ্যাকসিন                           | ৮০/=<br>(১০০ মাত্রা) | ২ বছরের উপর     | ১ মিলি চামড়ার নীচে                                 | নরমাল<br>ফ্রিজ |
| বাদলা ভ্যাকসিন                           | ৪০/=<br>(২০ মাত্রা)  | ৩ মাসের উপরে    | ৫ মিলি চামড়ার নীচে                                 | নরমাল<br>ফ্রিজ |
| গলাফুলা ভ্যাকসিন<br>(অয়েল)              | ৫০/=<br>(৫০ মাত্রা)  | ৬ মাসের উপরে    | ২ মিলি চামড়ার নীচে                                 | নরমাল<br>ফ্রিজ |
| পিপিআর ভ্যাকসিন                          | ৭০/=<br>(১০০ মাত্রা) | ৩ মাসের উপরে    | ১ মিলি চামড়ার নীচে                                 | ডিপ ফ্রিজ      |
| স্কুরার ভ্যাকসিন (FMD)<br>ট্রাইভ্যালেন্ট | ৪০০/=<br>(১৬ মাত্রা) | ৪ মাসের উপরে    | ৬ মিলি (বয়স্ক) বা<br>৩ মিলি (কমবয়সী) চামড়ার নীচে | নরমাল<br>ফ্রিজ |
| ছাগ বসন্ত (Goat Pox)                     | ৭৫/=<br>(১০০ মাত্রা) | ৩ মাসের উপরে    | ১ মিলি চামড়ার নীচে                                 | ডিপ ফ্রিজ      |
| জলাতংক (HEP)<br>ভ্যাকসিন                 | ৫০/=<br>(১ মাত্রা)   | ৩ মাসের উপরে    | ৩ মিলি মাংশে  | নরমাল<br>ফ্রিজ |
| জলাতংক (LEP)<br>ভ্যাকসিন                 | ৫০/=<br>(১ মাত্রা)   | ৪ মাসের উপরে    | ৩ মিলি মাংশে  | নরমাল<br>ফ্রিজ |

তথ্যসূত্র: প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।