# গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির টিকা: সংরক্ষণ ও ব্যবহার নির্দেশিকা

| টিকার নাম | সংরক্ষণের তাপমাত্রা ও মেয়াদ | প্রতি ভায়ালে টিকার মাত্রা | ব্যবহারবিধি | সেবা মূল্য (প্রতি ভায়াল) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| **গবাদিপ্রাণির টিকা** | | | | | |
| ১। ক্ষুরারোগ | ২°-৮°সে.- ৬ মাস | ১৬ | গরু/মহিষ-৬ সিসি চামড়ার নিচে<br>বাছুর-৩ সিসি চামড়ার নিচে<br>ছাগল/ভেড়া-২ সিসি চামড়ার নিচে | ৪০০/- | ৪ মাস বয়সে, ৪-৬ মাস অন্তর |
| ২। তড়কা | ২°-৮°সে.- ৬ মাস | ১০০ | গরু/মহিষ/ঘোড়া-১ সিসি চামড়ার নিচে<br>ছাগল/ভেড়া-০.৫ সিসি চামড়ার নিচে | ৮০/- | ৬ মাস বয়সে, ১ বছর অন্তর |
| ৩। বাদলা | ২°-৮°সে.- ৬ মাস | ২০ | গরু/মহিষ-৫ সিসি চামড়ার নিচে<br>ছাগল/ভেড়া-২ সিসি চামড়ার নিচে | ৪০/- | ৬ মাস-৩ বছর বয়সী প্রাণিতে, ৬ মাস অন্তর |
| ৪। গলাফুলা | ২°-৮°সে.- ৬ মাস | ৫০ | গরু/মহিষ-২ সিসি চামড়ার নিচে<br>ছাগল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নিচে | ৫০/- | ২ বছর বয়সে, ৬ মাস অন্তর। এনজুটিক এলাকায় ৬ মাস বয়সী বাছুরে অর্ধেক মাত্রায় |
| ৫। পিপিআর | -২০°সে.- ২ বছর<br>২°-৮°সে.- ৬ মাস | ১০০ | ছাগল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নিচে | ৭০/- | ৪ মাস বয়সে, ১ বছর অন্তর। মায়ের টিকা না দেয়া থাকলে বাচ্চায় ২ মাস বয়সে ১ম ডোজ, ৬ মাসে বুস্টার ডোজ |
| ৬। ছাগলের বসন্ত | -২০°সে.- ১ বছর<br>২°-৮°সে.- ১ মাস | ১০০ | ছাগল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নিচে | ৭৫/- | ২ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সী ছাগল/ভেড়ায় ১ বার |
| ৭। জলাতংক (LEP) | -২০°সে.- ১ বছর<br>২°-৮°সে.- ৬ মাস | ১ মাত্রা | কুকুর - ৩ সিসি মাংসে | ৫০/- | ৩ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সে, ১ বছর অন্তর |
| ৮। জলাতংক (HEP) | -২০°সে.- ১ বছর<br>২°-৮°সে.- ৬ মাস | ১ মাত্রা | কুকুরের বাচ্চা/বাছুর/বিড়াল/ছাগল ভেড়া/বানর-১.৫ সিসি, গরু-৩ সিসি মাংসে | ৫০/- | মায়ের টিকা না দেয়া থাকলে ২ মাস বয়সী কুকুরের বাচ্চায়, পরে ৪ মাস বয়সে LEP |
| **হাঁস-মুরগির টিকা** | | | | | |
| ৯। বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত (বিসিআরডিভি) | -২০°সে.- ১ বছর<br>-৫°-০°সে.- ৬ মাস<br>২°-৮°সে.- ১ মাস<br>থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ-১ দিন | ১০০ | যেকোন এক চোখে - ১ ফোঁটা | ২৫/- | ৪-৭ দিন বয়সে, ১৪ দিন পর বুস্টার ডোজ |
| ১০। বড় মুরগির রাণীক্ষেত (আরডিভি) | -৫°-০°সে.- ৬ মাস<br>২°-৮°সে.- ৪ মাস<br>থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ- ১ দিন | ১০০ | মাংসে - ১ সিসি | ২৫/- | ২ মাস বয়সে, ৬ মাস অন্তর |
| ১১। ফাউল পক্স | -২০°সে.- ১ বছর<br>-৫°-০°সে.- ৫ মাস | ২০০ | পালকের চামড়ায় খুঁচিয়ে | ৫০/- | ৩০ দিন বা তদুর্ধ্ব বয়সী বাচ্চায় ১ বার |
| ১২। পিজিয়ন পক্স | -২০°সে.- ১ বছর<br>-৫°-০°সে.- ৫ মাস | ২০০ | পালকের চামড়ায় খুঁচিয়ে | ৪০/- | ৩-৭ দিন বয়সী মুরগি/৭ দিন বা তদুর্ধ্ব বয়সী কবুতরে ১ বার |
| ১৩। হাঁস-মুরগির কলেরা | ২°-৮°সে.- ৬ মাস | ১০০ | চামড়ার নিচে - ১ সিসি | ৫০/- | ২ মাস বয়সে, ৬ মাস অন্তর |
| ১৪। সালমোনেলোসিস/ ফাউল টাইফয়েড | ২°-৮°সে.- ৬ মাস | ২০০ | চামড়ার নিচে -০.৫ সিসি | ২৪০/- | ৪৫ দিন বয়সে, ১ মাস পর বুস্টার ডোজ, ৬ মাস অন্তর |
| ১৫। গামবোরো | -২০°-০°সে.- ১ বছর | ১০০০ | যেকোন এক চোখে - ১ ফোঁটা | ২৫০/- | ১০-২১ দিন বয়সে, ৭ দিন পর বুস্টার |
| ১৬। ডাক প্লেগ | -২০°সে.- ১ বছর<br>-৫°-০°সে.- ৬ মাস<br>থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ-১ দিন | ১০০ | বুকের মাংসে - ১ সিসি | ৫০/- | ২১-৩০ দিন বয়সে, ৬ মাস অন্তর |
| ১৭। মারেক্স | -২০°সে.- ১ বছর<br>২°-৮°সে.- ৬ মাস | ১০০০ | চামড়ার নিচে -০.২ সিসি | ৪০০/- | ১ দিন বয়সে |