


সাকার ফিশ: দেশীয় প্রজাতির মাছের জন্য হুমকি



সাকার ফিশ যার ইংরেজি নাম Suckermouth catfish বা Common pleco; এটি মূলত স্বাদুপানির মাছ। সাকার মাউথ ক্যাটফিশ আশির দশকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল থেকে অননুমোদিতভাবে বাহারি মাছ হিসেবে প্রথম বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সাকার ফিশ নদী-নালা, খাল-বিল এবং চাষের পুকুরে চাষকৃত মাছের সাথে ব্যাপকভাবে ধরা পড়ছে মর্মে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, যা জীববৈচিত্র্য তথা দেশীয় প্রজাতির মাছের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাকার ফিশের বৈশিষ্ট্য

- সাকার ফিশের দেহ বহিরাবরণ কাঁটায়ুক্ত, আইশ অস্থিযুক্ত বর্মের ন্যায়, কালোর উপর সাদা মোজাইক দাগ;
- মাছটির মুখ চোষকযুক্ত নিম্নমুখী। মাছটি ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং সাকার ফিশ সর্বভুক শ্রেণির;
- স্বল্প অক্সিজেন এমনকি পানি ছাড়াও ৬০ ঘন্টা পর্যন্ত বাঁচতে পারে;
- দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে;
- জলাশয়ের তলদেশে শ্যাওলা, জৈব আবর্জনা, ছোট ছোট কীট, অন্যান্য মাছের ডিম ও রেণু পোনা খায়;
- এ মাছ ১০-১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং এ মাছের অভিযোজন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি;
- সাকার ফিশের দেহ কম মাংসল, অধিক বর্ম ও কাঁটায়ুক্ত বিধায় খাবার হিসেবে এর উপযুক্ততা কম;
- পোনা মাছ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত মাতাপিতার যত্নে (প্যারেন্টাল কেয়ার) থাকে বিধায় এদের বেঁচে থাকার হার অপেক্ষাকৃত বেশি।

সাকার ফিশ নিধনে করণীয়

- উন্মুক্ত বা বদ্ধ জলাশয়ে পাওয়া গেলে সাথে সাথে নিরাপদ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিনষ্ট করতে হবে।
- সেচের মাধ্যমে পুরোপুরি শুকিয়ে মাছ আহরণ করে বিনষ্ট করতে হবে।
- হ্যাচারিতে প্রজনন বা লালন-পালন করা যাবে না।
- অ্যাকুরিয়ামে শোভা বর্ধনকারী মাছ হিসেবে পালন বন্ধ করতে হবে।
- নতুন করে উন্মুক্ত জলাশয় বা বদ্ধ জলাশয়ে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

সাকার ফিশের ক্ষতিকর প্রভাব

- যে কোন জলজ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধির কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের সাথে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে।
- দেশীয় প্রজাতির মাছের ডিম ও রেণু ভক্ষণ করে মাছের বংশবিস্তারে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, সর্বোপরি জলজ জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে।
- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছসহ জলজ পোকামাকড়, শ্যাওলা, ছোট শামুকজাতীয় প্রাণী খেয়ে পরিবেশের সহনশীল খাদ্যশৃংখল নষ্ট করে।
- সাকার ফিশের ধারালো পাখনার আঘাতে সহজেই অন্য মাছের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- জলাশয়ের পাড়ে ক্ষেত্রবিশেষে ৫ ফুট পর্যন্ত গর্ত করে পাড়ের ক্ষতি করে এবং জলাশয়ের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা কমায়।

আসুন সবাই মিলে সাকার ফিশের বিস্তার রোধ করি



মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

