


এ পদ্ধতি মহিলাদের জন্য অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি। এতে রয়েছে একটি বা দুটি নরম চিকন ক্যাপসুল যা (দেয়াশলাই-এর কাঠির চেয়ে ছোট) মহিলাদের হাতের কনুইয়ের উপরে ভিতরের দিকে চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।



কখন ইমপ্ল্যান্ট নেয়া যায়

- ◆ যে কোন সক্ষম দম্পতি এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন
- ◆ মাসিকের প্রথম ৫-৭ দিনের মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট নিতে হবে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের কাছে ইমপ্ল্যান্ট নেয়া যায়।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

- ◆ এ পদ্ধতিটি ৩/৫ বছরের জন্য কার্যকর
- ◆ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে
- ◆ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালেও নেয়া যায়
- ◆ বুকের দুধ কমায় না
- ◆ প্রসব পরবর্তী পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায়
- ◆ প্রয়োজনে খুলে ফেলে দ্রুত সন্তান ধারণ করা যায়।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ

- ◆ কারো কারো ক্ষেত্রে মাসিক অনিয়মিত হতে পারে
- ◆ মাসিক বন্ধ হলে গর্ভসঞ্চারণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়
- ◆ মাসিকের সময় রক্তস্রাব বেশি হতে পারে
- ◆ দু-মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে
- ◆ মাথা ব্যথা হতে পারে
- ◆ ওজন বেড়ে যেতে পারে

অস্থায়ী পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদী)

আইইউডি

আইইউডি

মহিলাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অস্থায়ী ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি। এটি মহিলাদের জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কপার-টি ৩৮০A ব্যবহার করা হয়।



- ◆ একটি সন্তান থাকলে এ পদ্ধতি নেয়া যায়।

আইইউডি-এর সুবিধাসমূহ

- ◆ একটানা দশ বছরের জন্য কার্যকর। স্বাভাবিক প্রসবের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অথবা সিজারিয়ান অপারেশনের সময় আইইউডি গ্রহণ করা যায়।
- ◆ এটি প্রয়োগ করা সহজ, মাত্র কয়েক মিনিটে প্রয়োগ
- ◆ দীর্ঘমেয়াদী ও সহজলভ্য
- ◆ যখন ইচ্ছা ক্লিনিক/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে খুলে নেয়া যায়
- ◆ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মহিলারাও ব্যবহার করতে পারেন
- ◆ পদ্ধতি হিসেবে কার্যকর এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কম
- ◆ একটি সন্তান থাকলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়।
- ◆ সহবাসের সময় স্বামী/স্ত্রীর কোনো সমস্যা হয় না।

আইইউডি-এর অসুবিধাসমূহ

- ◆ আইইউডি প্রয়োগের পর প্রথম কয়েক মাস তলপেটে ব্যথা হতে পারে
- ◆ ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে
- ◆ মাসিকের পর নিয়মিত সুতা পরীক্ষা করতে হয়
- ◆ এটি প্রয়োগ, খোলা ও ফলো-আপ-এর জন্য ক্লিনিকে যেতে হয়।

মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতিকে টিউবেকটমি বলে।

- ◆ এটি একটি সহজ অপারেশন;
- ◆ যে কোনো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কিছু এনজিও ক্লিনিকে এ পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হয়।
- ◆ যে সকল সক্ষম দম্পতির ২টি জীবিত সন্তান আছে এবং ছোটটির বয়স কমপক্ষে ১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে



টিউবেকটমি-এর সুবিধাসমূহ

- ◆ অপারেশনের পর পরই এটি কার্যকর
- ◆ এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি
- ◆ অপারেশন সহজ, সময় লাগে মাত্র ১৫-২০ মিনিট
- ◆ কার্যকারিতার হার শতকরা ১০০ ভাগ
- ◆ কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।
- ◆ প্রসবের পর ৭ দিনের মধ্যে টিউবেকটমি করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক।

টিউবেকটমি-এর অসুবিধাসমূহ


- ◆ অপারেশনের পর হাসপাতাল/ ক্লিনিকে কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা থাকতে হয়।
- ◆ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার দ্বারা এ অপারেশন করতে হয়।
- ◆ পূর্বাবস্থায় সহজে ফিরে যাওয়া যায় না

অস্থায়ী পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদী)

এনএসভি (ভ্যাসেকটমি): পুরুষদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি

পুরুষদের জন্য এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি
(ছুরিবিহীন ভ্যাসেকটমি)

- ◆ এ পদ্ধতি স্থায়ী, কার্যকর ও নিরাপদ;
- ◆ একটি সহজ ও ছোট অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষের এই পদ্ধতি প্রদান করা হয়। এই অপারেশনকে বলে এনএসভি (ভ্যাসেকটমি)
- ◆ যে কোনো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কিছু এনজিও ক্লিনিকে এ পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হয়।
- ◆ যে সকল সক্ষম দম্পতির ২টি জীবিত সন্তান আছে এবং ছোটটির বয়স কমপক্ষে ১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য প্রযোজ্য



এনএসভি (ভ্যাসেকটমি)-এর সুবিধাসমূহ

- ◆ এটি ছুরি কাটাবিহীন স্থায়ী পদ্ধতি
- ◆ অপারেশনের দু'দিন পরেই স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করা যায়
- ◆ কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই
- ◆ অপারেশনের জন্য কোনো কাটা বা সেলাই লাগে না, রক্তপাত নেই বললেই চলে। মাত্র ৫-৭ মিনিট সময়

লাগে। অপারেশনের পর সামান্য ব্যথা থাকে

- ◆ যৌন ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

এনএসভি (ভ্যাসেকটমি)-এর অসুবিধাসমূহ

- ◆ অপারেশনের ৩ মাস পর থেকে কার্যকর হয়
- ◆ অপারেশনের পর প্রথম ৩ মাস সহবাসের সময় কনডম ব্যবহার অথবা স্ত্রীকে অন্য যে কোন অস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।
- ◆ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার দ্বারা এ অপারেশন করতে হয়।
- ◆ পূর্বাবস্থায় সহজে ফিরে যাওয়া যায় না